

Algunas cosas que puede hacer un bebé con audición normal:

Del nacimiento a los 3 meses de edad

- Parpadea o se sobresalta con ruidos fuertes repentinos
- Se queda callado o sonríe cuando le hablan
- Produce sonidos como “ohh” y “ahh”

De los 3 meses a los 6 meses de edad

- Busca los sonidos con los ojos
- Comienza a producir sonidos de balbuceo
- Produce muchos sonidos como chillidos y risitas

De los 6 a los 9 meses de edad

- Voltea la cabeza para buscar la fuente de algún sonido fuerte.
- Entiende “no-no” o “adiós”
- Balbucea, por ejemplo “ba-ba”, “ma-ma” and “ga-ga”

De los 9 a los 12 meses de edad

- Repite las palabras sencillas y sonidos que usted produce
- Usa correctamente “ma-ma” o “pa-pa”
- Responde a las canciones o a la música
- Señala los juguetes favoritos y otros objetos cuando se le pide que lo haga



¿Dónde puedo encontrar más información?

Si tiene preguntas sobre la audición de su bebé o sobre este folleto, puede obtener información adicional a través de:

- *Wyoming Department of Health*
Developmental Disabilities Division -
Teléfono: 800-510-0280
- *Wyoming EHDI Program* - Teléfono: 307-721-6212
- Su doctor
- **www.WyomingEHDI.org**
- www.babyhearing.org
- www.infanthearing.org

Programa de Detección Auditiva e Intervención Tempranas (EHDI), Wyoming



¡Es importante que a su bebé se le haga la prueba de la audición!

*Su bebé no puede decirle si puede oír
...su voz o las canciones de cuna de la abuela.*

Aproximadamente 12,000 bebés nacen con pérdida auditiva cada año en los Estados Unidos

www.WyomingEHDI.org

¿Por qué se le debe hacer la prueba de la audición a mi bebé?

- Más de la mitad de los bebés que nacen con pérdida auditiva son sanos y no tienen antecedentes familiares de pérdida auditiva.
- Para estar seguros de detectar a todos los bebés con pérdida auditiva, los hospitales con servicio de maternidad en Wyoming deben hacer la prueba de la audición a los bebés.
- Es importante detectar la pérdida auditiva tan pronto como sea posible. El primer año de vida es crítico en el desarrollo normal del habla y el lenguaje. La identificación temprana y la intervención son pasos claves.



¿Qué necesito saber sobre la prueba?

- La prueba es segura, no lastima a su bebé y solo toma 10 minutos.
- La mayoría de los bebés duermen durante la prueba.
- Se le entregarán los resultados tan pronto como se termine de hacer la prueba.

¿Qué sucede si mi bebé no pasa la prueba de la audición?

Es importante que siga las recomendaciones del personal del hospital, doctor, personal del centro para el desarrollo infantil, personal del programa EHDI y el audiólogo.

Si su bebé no pasa la prueba de la audición, ¡es importante que sea atendido a tiempo!

Detección Auditiva e Intervención Tempranas “1, 3, 6”

- 1** Prueba de la audición antes del primer mes de vida.
- 3** Evaluación audiológica antes de los tres meses de vida.
- 6** Plan para proporcionar servicios de intervención temprana antes de los seis meses de edad.

¿Es posible que un recién nacido pase la prueba de la audición y pierda la audición más tarde en la vida?

Sí, la prueba confirma que su bebé puede oír al momento en que se le hace la prueba, sin embargo, algunos bebés pueden perder la audición más tarde en la vida por alguna de las siguientes razones:

- Algunas enfermedades
- Algunas medicinas
- Antecedentes familiares de pérdida auditiva
- Infecciones del oído



¿Tiene motivos para creer que su hijo pudiera perder la audición en el futuro?

Los siguientes son factores de riesgo frecuentemente asociados a la pérdida auditiva en los bebés y niños. Es posible que su hijo pierda la audición si son ciertos algunos de estos factores:

- Existen antecedentes de pérdida auditiva infantil en la familia.
- La cabeza, la cara o las orejas se han desarrollado o tienen una forma diferente a lo normal.
- El niño se dio un golpe duro en la cabeza (que necesitó atención médica).
- Ha tenido infecciones de los oídos con acumulación de líquido por más de 4 meses.
- Pasó más de 48 horas en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
- Tiene algún trastorno neurológico que está relacionado con la pérdida de la audición (pregúntele al doctor).
- Estuvo expuesto a alguna infección antes de nacer.
- Ha tenido alguna infección alrededor del cerebro y la médula espinal causada por bacterias (meningitis bacteriana).
- Tuvo una fuerte ictericia (hiperbilirrubinemia) al nacer y fue sometido a un procedimiento especial (transfusión sanguínea).
- Piensa que su hijo tiene problemas para oír.